

Cardinal

Synonyme Bezeichnungen: Apostoliatiko, Karaburnu Rannii, Kardinal, Rannii Carabournu

Herkunft: Züchtung aus den USA

Abstammung: Flame Tokay x Alphonse Lavallee

Verbreitung in AUT: sporadisch vorkommend

Ampelographische Merkmale:

MERKMALE WÄHREND DER BLÜTEZEIT

Junger Trieb: Triebspitze offen, schwache Anthozyanfärbung, schwach wollig behaart;

halb aufrechte bis waagrechte Triebhaltung;

Internodien: dorsal: grün, ventral: grün;

Knospenschuppen: fehlende Anthozyanfärbung;

diskontinuierliche Verteilung der sehr langen Ranken;

Junges Blatt: Oberseite: kupferrot auf der ganzen Blattfläche,

Blattunterseite: Wollbehaarung zwischen den Nerven;



BEOBSACHTUNGSZEITRAUM VOM BEEREN-ANSATZ BIS ZUM WEICHWERDEN DER BEEREN:

Ausgewachsenes Blatt: Fünfeckig, mit 5 Lappen und V- oder gewelltes Profil; Hauptnerven auf dem Stielansatz rot; Die Spreite ist nicht gewaffelt und schwach blasig; Blattzähne gerade bis rundgewölbt; Stielbucht offen mit U-förmiger Basis; von Nerven nicht begrenzt; keine Stielbuchtzähne; keine Zähne in den oberen Seitenbuchten vorkommend. Blattunterseite schwach behaart, Beborstung der Hauptnerven schwach.



TRAUBE UND BEERE WÄHREND DER REIFE:

Traube: ist lang (>25 cm); locker bis sehr locker;
Grundform ist kegelförmig mit drei und mehr Flügeln;

Traubenstiel: ist sehr kurz (<3 cm);

Beere: Form ist rundlich, Länge ist mittellang bis sehr lang (20-26 mm),
Breite ist mittellang bis sehr lang (20-26 mm);
Einzelbeerengewicht ist hoch aber unregelmäßig (bis zu 8 g);
Beerenhaut ist dunkelrot-violette bis blau-schwarz;
ungefärbtes Fruchtfleisch; Geschmack neutral;



Phänologie:

Austrieb: mittel;

Blütezeit: mittel;

Reifezeit: früh;

Resistenz gegenüber Winterfrost: schwach;

Regeneration nach Frühjahrsfrost: schwach;

Resistenz gegenüber pilzlichen Schaderregern:

Plasmopara: schwach;

Oidium: schwach;

Botrytis: schwach;

Neigung der Beeren zum Platzen nach

Herbstniederschlägen: gering bei normaler Erntereife;

Agrarische Eigenschaften:

Beeren platzen bei Vollreife leicht auf;

Qualitätsprofil der Weine:

Tafeltraube, nur einfachste Weinqualität;

Züchterische Bearbeitung:

in Österreich keine;