

***Prunus armeniaca* L.**

Marille	Voraussetzung für die Aufnahme einer Sorte in das Sortenverzeichnis der allgemein bekannten Obstsorten Österreichs (ABO-Sorten) ist die erstmalige Inverkehrbringung vor 30. September 2012 und eine vorliegende amtlich anerkannte Beschreibung. Die Liste entbindet den Verwender nicht von einer Überprüfung eines möglichen nationalen oder gemeinschaftlichen Sortenschutzes.	
Sortenbezeichnung	Sortennamen, alphabetisch sortiert	
Synonyme		
Blühbeginn (erste vollständig geöffnete Blüten)	sehr früh, früh, mittel, spät, sehr spät	
Fruchtgröße	extrem klein, klein, mittel, groß, extrem groß	
Fruchtform	kugelig, abgeflacht, oval, eiförmig, herzförmig, rechteckig	
Tiefe der Stielhöhle	flach, mittel, tief	
Reifebeginn	sehr früh, früh, mittel, spät, sehr spät	
Grundfarbe	nicht sichtbar, weiß, gelblich, gelbgrün, hellorange, orange, dunkelorange	
Deckfarbe	orangerot, rot, rosa, purpur	
Fruchtfleisch	weiß-grün, weiß, creme, gelb, hellorange, dunkelorange, rot	
Allgemeine Beobachtungen	Besonderheiten, Anfälligkeiten, Toleranzen, Sonstiges...	

**Für detaillierte Erklärungen
siehe TBB-*Prunus armeniaca***

Sortenverzeichnis der allgemein bekannten Obstsorten

Marille *Prunus armeniaca* L.

Identifikationsnummer	Sortenbezeichnung	Synonyme	Blühbeginn (erste vollständig geöffnete Blüten)	Fruchtgröße	Fruchtform	Tiefe der Stielhöhle	Reifebeginn	Grundfarbe	Deckfarbe	Fruchtfleisch	Allgemeine Beobachtungen
1193	Alessandrinische Marille	Frühe Gelbe Italienische, Große Frühe, Saint-Jean-Marille, Albicocco Alessandrino	früh	mittel	oval	tief	früh	hellorange	orangerot	creme	Kräftiger Wuchs, frostempfindlich
1194	Alte Ananas-Marille		früh	mittel	kugelig	tief	mittel	hellorange		hellorange	Baum wächst mittelstark, widerstandsfähig, fruchtbar, langlebig, 'Alte Ananas' ist als Population anzusprechen, wahrscheinlich aus der 'Großen Gemeinen Marille' hervorgegangen
1195	Ambrosia	Schafsnasenaprikose		mittel	oval		spät	gelblich	gelb -orange	gelb - orange	Wuchs mittel, fruchtet reich, regelmäßig, anspruchslos, Blüte widerstandsfähig, Baum nicht ganz frostfest
1196	Ananasmarille		mittel	mittel	abgeflacht	tief	mittel	hellorange	rot	orange	meist ähnlich 'Marille von Breda'
1197	Bisamberger Knödelmarille		früh	klein	kugelig	flach	mittel	hellorange		gelb	kräftiger Wuchs, widerstandsfähig gegen Frost u. Hitze, Ertrag setzt spät ein, fruchtbar und langlebig
1198	Braunauer große Frühmarille			groß	eiförmig		mittel	hellorange	rot	hellorange	Baum schwachwüchsig, wird mittelgroß, sehr fruchtbar
1199	Breda	Haselnußaprikose, Orangenaprikose, Amade, Rotterdamer -, Brüssler Aprikose	mittel	mittel	abgeflacht	tief	mittel	hellorange	rot	gelb	'Breda' besteht aus 3 Sorten: Bredaaprikose, Holländische Aprikose, Ananasaprikose; Blüte frostempfindlich, Wuchs mittelstark, gut fruchtbar
1200	Dürkheimer Marille	Dürkheimer Aprikose, Dürkheimer Goldaprikose, Mandelaprikose Doucoeur		mittel	kugelig		spät	gelblich		gelb	
1201	Feldsberger Marille			groß	abgeflacht	flach	spät	gelblich	orange	hellorange	Kräftiger Wuchs, Ansprüche gering, sonnige Lagen, mittlere Fruchtbarkeit
1202	Frühe Kecskemeter Marille	Koranyi Barack		klein	abgeflacht		früh	gelblich	purpur	gelb	
1203	Frühe Moorpark			groß	oval	tief	mittel	hellorange	gelb -orange	gelb - orange	wuchs kräftig, fruchtbar, widerstandsfähig

Sortenverzeichnis der allgemein bekannten Obstsorten

Marille *Prunus armeniaca* L.

Identifikationsnummer	Sortenbezeichnung	Synonyme	Blühbeginn (erste vollständig geöffnete Blüten)	Fruchtgröße	Fruchtform	Tiefe der Stielhöhle	Reifebeginn	Grundfarbe	Deckfarbe	Fruchtfleisch	Allgemeine Beobachtungen
1204	Frühe Rosenmarille	Rotbackige, Ungarische frühe Rosenmarille = Koranyi rosa Barack, Frühe Kremser Rosenmarille, Ungarische frühe Rosenmarille, Frühe rosa Wachauer	spät	groß	kugelig	flach	früh	gelblich	rosa	dunkelorange	Wuchs kräftig, Ertrag früh, regelmäßig, Widerstandsfähig gegen Frost, Monilia, mehrere Typen vorhanden: Frühe Rosenmarille, Späte Rosenmarille,.... event. zählt auch die Kecskemeti Marille zum Formenkreis. Die Späte Rosenmarille ist höher, flacher, weniger gerötet und der Stein schlanker als bei der Frühen Rosenmarille und wird meist nur Rosenmarille genannt
1205	Frühe Ungarische Gelbe		früh	klein	kugelig	mittel	früh	gelblich	rot	gelb	
1206	Frühe von Göttsweig			groß			mittel				
1207	Frühe von Hinterholzer				abgeflacht		früh				entstand Mitte des 19. Jh. In Oberloiben / Wachau
1208	Frühe von Kittsee	Frühmarille von Radovitsch	früh				früh				von Duhan, Falch u Strauss aus 'Frühen Ungarischen Gelben' ausgelesen
1209	Frühe von Radovic	Frühe von Kittsee	früh	klein	kugelig		früh	gelblich	orange		
1211	Frühzeitige Marille	Kleine Frühmarille, Nikolsburger Frühmarille; Muskateller Aprikose, Red Masculine, Grazer Frühmarille		klein	abgeflacht	mittel	sehr früh	hellorange	orange	gelb	Wuchs mittelstark, anspruchslos, frosthart, fruchtbar
1212	Gelbe Wachauer Marille	Alt Gelbe, Gelbe Wachauer		mittel	abgeflacht	tief	spät	gelblich		gelb	mittlere Wachstum, gute Fruchtbarkeit, nicht ganz frosthart, Blüte etwas empfindlich, schlecht lagerfähig
1213	Große Ananas-Marille	Zneimer Ananas		mittel	abgeflacht	tief		gelblich	orange	hellorange	Wuchs kräftig, anspruchslos, fruchtbar, wahrscheinlich aus Großer Gemeiner Marille hervorgegangen
1214	Große Gemeine Marille	Brüssler Marille, Römische Marille	mittel	groß	eiförmig	mittel	mittel	gelblich	orange	gelb	Bäume starkwüchsig, wird groß und alt, Ertrag spät aber regelmäßig, anspruchslos
1215	Große Kremser Marille	Klosterneuburger Marille Typ Schreiber	früh	mittel	kugelig	mittel	mittel	hellorange	rot	gelb	als Population verbreitet
1216	Holländische Marille	Holländische Ananas		mittel	abgeflacht	mittel		hellorange		gelb	Wuchs mittelstark, verträgt scheckt Baumschnitt, fruchtbar, gute Lagen
1217	Holubs Marille	Gezuckerte Aprikose von Holub, Sucre de Holub, Zuckeraprikose		mittel	oval	tief	mittel	orange	rot	hellorange	Baum starkwüchsig, widerstandsfähig, mittel fruchtbar, mittlerer Säuregehalt

Sortenverzeichnis der allgemein bekannten Obstsorten

Marille *Prunus armeniaca* L.

Identifikationsnummer	Sortenbezeichnung	Synonyme	Blühbeginn (erste vollständig geöffnete Blüten)	Fruchtgröße	Fruchtform	Tiefe der Stielhöhle	Reifebeginn	Grundfarbe	Deckfarbe	Fruchtfleisch	Allgemeine Beobachtungen
1218	Honigmarille			mittel	oval	flach	mittel	orange		creme	Lokalsorte Kamptal, Zufallssämling, mäßiges Wachstum, reichtragend, widerstandsfähig gegen schlechte Witterungseinflüsse
1219	Keckemeter Rosenaprikose	Späte Keckemeter, in Ö: Mariazeller Marille	mittel	mittel		mittel		gelb -orange	rot	dunkelorange	platzt nicht bei Regen
1220	Kleine rote Frühmarille	Angoumois		klein	kugelig	mittel	früh	orange	rot	dunkelorange	Baum mit mäßigem wachstum, anspruchslos, fruchtbar
1221	Kleine Ananas Marille			klein	oval	tief		gelblich	orange	hellorange	Baum mit mittlerem Wuchs, langlebig und fruchtbar
1222	Kleine rote Marille										
1223	Kleine weiße Marille	Pfirsichmarille, Kleine weiße Frühe		klein	kugelig	flach	mittel	gelblich		gelb	Wuchs mäßig, kleine Kronen, fruchtbar, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse
1236	Klosterneuburger Marille	Rote Marille	mittel	groß	kugelig	mittel	mittel	orange	purpur	dunkelorange	Formenkreis umfasst Ungarische, Langenloiser und Klosterneuburger
1224-1235, 1237-1250		in ihren Abweichungen vom Standard-Typ	mittel	mittel	kugelig	mittel	mittel	orange	purpur	dunkelorange	
1251	Königsmarille	Abricot Royal, Royal de Württemberg, Königliche Marille, Royal Orange		mittel	oval	tief	spät	gelbgrün	orangerot	hellorange	bleiben bei uns eher unansehnlich, Wuchs kräftig, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse
1253	Kremser Marille			groß	abgeflacht	flach	spät	orange	orangerot	gelb	Zufallssämling aus Großer Gemeiner x Nancy?, Große Kremser ist selbststeril? Wuchs kräftig, große Kronen, warme Lagen, frostempfindlich, Früchte platzen u. faulen bei Regenperioden
1254	Ladakh Marille			klein			mittel	orange	orangerot	hellorange	mandel Bitter
1255	Langenloiser Marille	Rote Marille		groß	eiförmig	tief	spät	orange	rot	hellorange	Kräftiger Wuchs, mittelgroße Kronen, Widerstandsfähig, fruchtbar, ähnlich Klosterneuburger oder Ungarischen Beste
1256	Löschnig - Marille	Schalbergmarille		extrem groß	oval	tief		gelblich	orangerot	hellorange	frosthart, fruchtbar
1257	Luizets Marille	Luise-Aprikose, Abricot du Clos,	sehr spät	mittel	herzförmig	tief	früh	hellorange	orange	hellorange	kräftiger Wuchs, reichtragend, widerstandsfähig gegen Frost und Trockenheit
1258	Magyar Kajszi	Gruppe Ungarische Beste		groß		tief	mittel	orange	rot	dunkelorange	
1259		Gruppe Ungarische Beste		mittel		tief	mittel	orange	rot	dunkelorange	
1261	Mombacher Frühe			mittel	abgeflacht		spät	gelblich	gelb -orange	gelb	Wuchs mittelstark, ertragreich

Sortenverzeichnis der allgemein bekannten Obstsorten

Marille *Prunus armeniaca* L.

Identifikationsnummer	Sortenbezeichnung	Synonyme	Blühbeginn (erste vollständig geöffnete Blüten)	Fruchtgröße	Fruchtform	Tiefe der Stiehhöhle	Reifebeginn	Grundfarbe	Deckfarbe	Fruchtfleisch	Allgemeine Beobachtungen
1262	Moorpark			mittel	abgeflacht	flach	spät	gelb -orange		hellorange	starkwüchsig, anspruchslos, mäßig fruchtbar
1263	Nancy-Marille	Royal du Luxembourg, Brüssler -, Deutsche-, Große Zuckeraprikose, Lothringer-, Luxenburger-, Württemberger Aprikose, Pfirsichaprikose	mittel	mittel	oval	mittel	mittel	hellorange	orangerot	hellorange	Kräftiger Wuchs, geringe Ansprüche an Boden und Lage
1264	Orangerote Marille	Orangerote	spät	klein	kugelig	mittel	mittel	orange	orangerot	orange	Sämling der turkmenischen Marille im botanischen Garten Nikitsk, Krim, starkwüchsig, gesund, langlebig, ertragreich
1265	Pawlowitzer Marille	Große Pawlowitzer, Velkopavlovicka, Pawlowicka		mittel	abgeflacht	mittel	mittel	orange	orangerot	dunkelorange	Zufallssämling Südmähren, kräftiger Wuchs, fruchtbar, widerstandsfähig
1267	Rotmaler Marille			groß	abgeflacht	tief	spät	gelblich	rot	hellorange	großes Blatt, auffallend rot, kräftiger Wuchs, reichtragend, anspruchslos
1268	Schöllschitzer Marille		mittel	mittel	abgeflacht	tief	mittel	gelblich	orangerot	gelb	Zufallssämling aus Mähren, kräftiger Wuchs, mittel fruchtbar, frostempfindlich, herzförmige Blütenblätter (Ambrosia breitoval)
1269	Späte Rosenmarille	Rosenmarille (späte)		mittel	eiförmig	mittel	spät	hellorange	orangerot	hellorange	mittlerer Wuchs, regelmäßig fruchtbar, anspruchslos,
1270	Tiroler Spähtblüher			mittel	abgeflacht		mittel	orange	orangerot	orange	2 Mandeln
1271	Triumph von Trier	Ruhm von Trier	mittel	groß	eiförmig	tief	mittel	gelblich	gelb -orange	gelb	Baum mit kräftigem Wuchs, anspruchslos, kältefest, Blüte unempfindlich
1272	Ungarische Beste		mittel	mittel	kugelig	mittel	mittel	orange	purpur	dunkelorange	Zufallssämling 1868, Ungarn
1273-1282		in ihren Abweichungen vom Standard-Typ	mittel	mittel	kugelig	mittel	mittel	orange	purpur	dunkelorange	
1283	Ungarische Marille	Rote oder Große Rote	spät	mittel	abgeflacht		mittel	gelb -orange	rot	hellorange	starkwüchsig und ausdauernd, von guter Tragbarkeit
1287	Vinschger Marille	Vinschgauer Marille, Vinschgauer Marille		klein	kugelig	mittel	spät	gelb -orange	orangerot	gelb - orange	Wuchs kräftig, fruchtbar, widerstandsfähig
1288	Wachauer Marille	Alt Gelbe, Gelbe Wachauer		mittel	abgeflacht	tief	spät	gelblich		gelb	mittlere Wachstum, gute Fruchtbarkeit, nicht ganz frosthart, Blüte etwas empfindlich
1289	Wahre Ananas Marille	Kremser-, Bisamberger-, Goldananas		mittel	oval	tief	mittel	hellorange		hellorange	kräftiges Wachstum, fruchtbar, Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse
1290	Wahre große Frühe	Große Frühmarille, Royal, Gros Hatif, Précoce Esperen, Frühe Esperen, Große Ungarische, Punktierter Marille	früh	mittel	oval	tief	mittel	hellorange		hellorange	kräftiger Wuchs, fruchtbar, empfindlich gegen Frost - gute Lagen, 1790, D, Erfurt, aus ungarischer Sorte?