

# Terez

**Synonyme Bezeichnungen:** keine

**Herkunft:** Ungarn

**Abstammung:** Eger 2 x Olimpia

**Verbreitung in AUT:** fast nicht vorhanden

## Ampelographische Merkmale:

### MERKMALE WÄHREND DER BLÜTEZEIT

Junger Trieb: Triebspitze offen, keine Anthozyanfärbung, schwach bis mittel wollig behaart;

halb aufrechte Triebhaltung;

Internodien: dorsal: rot, ventral: grün;

Knospenschuppen: keine Anthozyanfärbung;

diskontinuierliche Verteilung der langen Ranken;

Junges Blatt: Oberseite: grüne Blattfläche mit bronzierten Stellen,

Blattunterseite: schwache Wollbehaarung zwischen den Nerven;



### BEOBACHTUNGSZEITRAUM VOM BEEREN-ANSATZ BIS ZUM WEICHWERDEN DER BEEREN:

Ausgewachsenes Blatt: Keilförmig bis fünfeckig mit 3 Lappen und ein ebenes Profil;

Hauptnerven auf der Blattoberseite ohne Anthozyanfärbung;

Die Spreite ist sehr schwach gewaffelt und nur sehr schwach blasig;

Blattzähne sind beiderseits geradlinig;

Stielbucht offen mit U bis V-förmiger Basis;

kaum von Nerven begrenzt;

Zähne in der Stielbucht und in den oberen Seitenbuchten fehlen;

Blattunterseite schwache bis mittlere Behaarung,

schwache bis mittlere Beborstung der Hauptnerven.



## TRAUBE UND BEERE WÄHREND DER REIFE:

Traube: ist lang bis sehr lang (20-24 cm); locker;  
Grundform ist kegelförmig mit ein bis vier Flügeln;  
Beitraube nicht vorhanden;

Traubenstiel: ist lang (9 cm);

Beere: Form ist oval bis elliptisch, Länge ist mittel bis lang (18-23 mm), Breite ist schmal bis mittel (13-18 mm);

Einzelbeeregewicht ist gering bis mittel (ca.3-5 g);

Beerenhaut ist grün-gelb;

Mäßig festes Fruchtfleisch; neutraler Geschmack;

Samen vollständig ausgebildet;



### **Phänologie:**

Austrieb: mittel;

Blütezeit: mittel bis spät;

Reifezeit: mittel bis spät;

Resistenz gegenüber Winterfrost: tolerant;

Regeneration nach Frühjahrsfrost: gering;

Resistenz gegenüber pilzlichen Schaderregern:

Plasmopara: stark;

Oidium: stark;

Botrytis: mittel;

Neigung der Beeren zum Platzen nach

Herbstniederschlägen: nicht bekannt;

### **Agrarische Eigenschaften:**

empfindlich auf Sonnenbrand und Schwarzfäule, verrieselungsgefährdet,  
leistungsstark;

### **Qualitätsprofil der Weine:**

unbekannte Weinqualität, Tafeltraubensorte mit neutralem eher faden Geschmack;

### **Züchterische Bearbeitung:**

in Österreich keine;