

Aron

Synonyme Bezeichnungen: keine

Herkunft: Züchtung aus Ungarn

Abstammung: SV 12375 x Perlette

Verbreitung in Österreich: geringfügig

Ampelographische Merkmale:

Merkmale während der Blütezeit

Junger Trieb: Triebspitze offen, mittlere Anthocyanfärbung, kaum wollig behaart, halb aufrechte Triebhaltung, diskontinuierliche Verteilung der mittelkurzen Ranken

Internodien: dorsal grün mit roten Streifen, ventral grün

Knospenschuppen: mittlere Anthocyanfärbung auf der ganzen Knospe

Junges Blatt - Oberseite: grüne Blattfläche mit bronzierten Stellen

Junges Blatt - Unterseite: sehr schwache Wollbehaarung zwischen den Nerven



Beobachtungszeitraum vom Beerenansatz bis zum Weichwerden der Beeren

Ausgewachsenes Blatt: fünfeckig, fünf Lappen, nach außen umgerolltes Profil, keine Anthocyanfärbung der Hauptnerven auf der Blattoberseite, mittlere Waffelung der Spreite und schwach blasig, Zähne beiderseits hohl gewölbt, Stielbucht weit offen mit U-förmiger Basis und ohne Zähne, nicht von Nerven begrenzt, obere Seitenbucht ohne Zähne, Unterseite nicht bis schwach behaart, keine bis schwache Beborstung der Nerven



Traube und Beere während der Reife

Traubenstiel: kurz bis mittel (5-7 cm)

Traube: lang bis sehr lang (20-24 cm), mitteldicht, Grundtraube zylindrisch mit ein bis zwei Flügeln, Beitraube vorhanden

Beere: oval (l = ~23 mm, b = ~18 mm), Einzelbeeregewicht mittel (~5 g), Haut grün-gelb, weiches Fruchtfleisch, Samen vollständig ausgebildet

Phänologie:

Austrieb	spät
Blütezeit	spät
Reifezeit	mittel
Winterfrost-Resistenz	mittel
Frühjahrsfrost-Regeneration	schwach
Plasmopara-Toleranz	mittel bis hoch
Oidium-Toleranz	schwach bis mittel
Botrytis-Toleranz	mittel
Platzneigung	mittel bis schwach



Agrarische Eigenschaften:

ertragreich, Beeren neigen bei feuchtem Wetter zum Aufplatzen

Qualitätsprofil der Weine:

Tafeltraube

Züchterische Bearbeitung:

in Österreich keine

